



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم (عج)

GHAEM GENERAL HOSPITAL



آپمول اپرکس (اریتروپویتین)



تهیه و تنظیم: واحد ارتقاء سلامت

تاریخ تهیه: خرداد ماه ۱۴۰۰

نکات قابل توجه:

- در صورت دچار شدن به سردرد میگری حتماً به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، می توانید دارو را تزریق نمایید. در صورت کم بودن فاصله زمانی تا نوبت بعدی از دو برابر مصرف نمودن دارو خودداری شود.



آدرس: کرج . بلوار دانش آموز

تلفن: ۰۲۶-۳۲۷۷۱۰۴۰

۰۲۶-۳۲۷۷۱۰۰۰-۶


www.ghaemkarajhospital.com

نواحی تزریق دارو:

- ۱-قبل از تزریق دارو دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- ۲-محل تزریق را ضد عفونی کنید.
- ۳-سوزن را با زاویه ۴۵ درجه وارد نموده و سرنگ را تخلیه نمایید.

توجه:

سرنگ حاوی دارو نیازی به هواگیری ندارد.



موارد مصرف دارو :

این دارو توسط پزشک متخصص تجویز میشود. اریتروپویتین برای کم خونی ناشی از فقدان اریتروپویتین در نارسایی مزمن کلیه بکار می رود.

شکل ظاهری دارو به صورت سرنگ های حاوی دارو و آماده تزریق می باشد.



شرایط نگهداری دارو :

این دارو حتماً در یخچال در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

این دارو در دمای اتاق (۲۵ درجه سانتی گراد) حداکثر تا ۷ روز قابل نگهداری میباشد.

بهتر است دارو در بسته بندی اولیه نگهداری شود و از نور محافظت گردد.

در صورت آسیب پکیج اولیه و مشاهده هر گونه تغییر رنگ یا ذرات معلق از مصرف دارو خودداری نمایید.

آماده سازی دارو جهت تزریق :

۱- پیش از برداشتن دارو از یخچال دست های خود را با آب و صابون بشویید.

۲- صبر کنید تا مدتی دارو با دمای اتاق یکسان شود. در این مدت دارو باید از هر نوع منبع نور یا گرما دور باشد.

۳- دارو نباید بیش از یک ساعت در دمای اتاق نگه داشته شود.

۴- از گرم کردن سریع دارو کمتر از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه خودداری نمایید.

۵- از گرم کردن دارو با استفاده از مالش شدید در میان کف دست خودداری نمایید.

نحوه تزریق دارو:

داروی اپرکس به صورت زیر جلدی تزریق میشود.

روش های تزریق

Injection technique

