




بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم (عج)

GHAEM GENERAL HOSPITAL

آندوسکوپی



تهیه و تنظیم: واحد ارتقاء سلامت

تاریخ تهیه: اسفند ماه ۱۴۰۰

منبع: بروزر سودارت ۲۰۱۴

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ درد شدید و یا مداوم شکم
- ✓ مدفوع سیاه یا سفید
- ✓ استفراغ

با آرزوی سلامتی برای شما مددجوی گرامی



آدرس: کرج . بلوار دانش آموز

تلفن: ۰۲۶-۳۲۷۷۱۰۴۰

۰۲۶-۳۲۷۷۱۰۰۰-۶

www.ghaemkarajhospital.com

- ممکن است تا یک ساعت پس از آندوسکوپی قادر به قورت دادن و بلعیدن نباشید. پس از آن می توانید بطور عادی بخورید و بیاشامید .
- ممکن است تا پایان روز احساس درد خفیفی در انتهای گلویتان داشته باشید و یا مقداری هوا در معده تان باقی مانده باشد و احساس نفخ را داشته باشید. هر دو این حالت ها رفع خواهد شد و نیازی به درمان نیست .

❖ توصیه ها :

- *رعایت نکات زیر پس از انجام آندوسکوپی زیر ضروری است :
- ۱-رانندگی نکنید.
- ۲-کارهای دقیق و ظریف انجام ندهید.
- ۳-مشروبات الکلی ننوشید.

❖ زمان اطلاع از نتیجه آزمایش


- در بسیاری از موارد پزشک یا پرستار می توانند گزارش آندوسکوپی را بلافاصله پس از هوشیاری شما اعلام نمایند.
- اگر از معده تان نمونه برداری شده باشد اعلام نتیجه چند روزی طول خواهد کشید.
- در اولین فرصت پیگیر درمان خود باشید و نتیجه آندوسکوپی را به پزشک درخواست کننده اطلاع دهید.
- در حفظ و نگهداری جواب آندوسکوپی کوشا باشید.

❖ آندوسکوپي چیست؟

آندوسکوپي اقدامي است که توسط آن پزشک ، امکان مشاهده مستقیم مجرای داخلی مری ، معده و دوازدهه را می یابد. این آزمایش بهترین و دقیق ترین راه تشخیص زخم و بیماری های دستگاه گوارش ، عفونت ، پلیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی می باشد. در برخی موارد آندوسکوپي جهت کنترل خونریزی و برداشتن پلیپ نیز انجام می شود.

❖ شیوه انجام آندوسکوپي :

آندوسکوپ یک لوله باریک و انعطاف پذیر است با یک منبع نور درخشان که در انتهای آن قرار دارد و با کمک آن پزشک تصویر واضحی از سطح داخلی مری ، معده و دوازدهه بدست می آورد و می تواند هرگونه بیماری و مشکلی را در این قسمت بررسی کند.



۱

❖ آمادگی قبل از آندوسکوپي:

* ۸ ساعت قبل از انجام آندوسکوپي از خوردن و نوشیدن مایعات اجتناب کنید.
* قبل از انجام آندوسکوپي تمام دارو های مصرفی را به اطلاع پزشک برسانید به ویژه داروهای ضد انعقاد مثل : آسپرین ، وارفارین ، پلاویکس و ریوارکسابان و انسولین . ممکن است پزشک ترجیح دهد که یک یا چند روز قبل از انجام آندوسکوپي بعضی داروهای شما قطع شوند.

* در صورتی که به بیماری هایی مانند هیپاتیت یا ایدز مبتلا هستید حتماً پیش از انجام آندوسکوپي این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید.

* اگر به اختلالات خونریزی دهنده مبتلا هستید حتماً این موضوع را به اطلاع پزشک برسانید تا اقدامات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی را مهیا کند.

* مدارک پزشکی شامل آندوسکوپي های قبلی و جواب آزمایشات خود را به همراه داشته باشید.

❖ مراحل انجام آندوسکوپي :

* شما به آرامی بر روی سمت چپ خود دراز بکشید.
* در صورتی که نیاز به تزریق داروی آرام بخش برای شما تجویز شود ، پرستار برای شما یک راه وریدی باز می کند (رگ می گیرد) و آن را به سرم

۲

وصل می کند و داروی آرام بخش از طریق سرم به شما تزریق می شود.

* در مرحله بعد داروی بی حسی به حلق شما اسپری خواهد شد، این دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بی حسی در گلو داشته باشید و توانایی بلعیدن (قورت دادن) شما را از بین ببرد.

* با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندان های شما محافظت خواهد شد.

* عمل فرستادن آندوسکوپ به سوی معده موجب درد یا مشکل تنفسی نخواهد شد.

* معاینه تمام نواحی معده که تقریباً ۱۵ دقیقه به طول می انجامد. مقداری هوا از طریق لوله به پایین فرستاده می شود تا معده را متسع کند و به پزشک امکان دریافت تصاویر واضح تری را بدهد. در پایان بررسی این حجم هوا خارج می گردد.

* در پایان بررسی نیز لوله سریع و آسان خارج می شود.

❖ پس از انجام آندوسکوپي:

شما به اتاق ریکاوری منتقل خواهید شد و فشار خون شما کنترل خواهد شد.



۳