



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قائم (عج)

Ghaem Specialty and Subspecialty Hospital



تهیه و تنظیم: واحد ارتقاء سلامت

تاریخ تنظیم: اردیبهشت 1400



آدرس

کرج. بلوار دانش آموز

تلفن:

02632771000-6

www.ghaemkarajhospital.com

دوره نفاقت عمل کورتاژ تشخیصی

عمل دیلاتاسیون و کورتاژ مدت زیادی طول نمی کشد و بیمار می تواند بعد از چند ساعت به خانه برگردد.

ممکن است به مدت یک تا 2 روز برای انجام کارهای روزمره به کمک نیاز داشته باشید.

اگر بیهوشی عمومی انجام شده، گاهی کمی تهوع و استفراغ یا احساس خواب آلودگی و ضعف برای مدت کوتاهی شما را آزار می دهد.

بعد از دیلاتاسیون و کورتاژ یک لایه دیگر در رحم رشد می کند. ممکن است قاعدگی در زمان مشخصی که همیشه اتفاق می افتاد، رخ ندهد و کمی عقب بیفتد.

نکته دیگر اینکه به دلیل بازتر شدن دهانه رحم،

باکتری ها میتوانند به راحتی داخل رحم شوند و این

باعث عفونت می شود. بهتر است در مورد شروع

رابطه زناشویی یا استفاده از تامپون از پزشک خود

سوال کنید. بعد از اتمام این عمل و بازگشت نتایج

نمونه برداری از آزمایشگاه، پزشک در مورد ادامه

روند درمانی با شما صحبت خواهد کرد.

آمادگی های قبل عمل کورتاژ

برای انجام کورتاژ نیاز است که فرد موارد زیر را رعایت کند:

1. انجام آزمایشات درخواستی پزشک
2. در صورت وجود عفونت زنان حتما درمان انجام شود.
3. عدم مصرف خوراکی یا نوشیدنی از شب قبل
4. در صورت مصرف هرگونه دارویی حتما به پزشک خود اطلاع داده شود.
5. قبل از انجام عمل مثانه تخلیه شود.



دلایل انجام کورتاژ تشخیصی

1. خونریزی های غیرطبیعی
2. هیپرپلازی آندومتر (رشد بیش از حد لایه داخلی رحم)
3. فیبروم های رحمی (تومورهای خوش خیم رحم)
4. تومورهای بدخیم رحمی
5. پولیپ های آندومتر
6. عدم تعادل هورمونی



کورتاژ تشخیصی

(Diagnostic curettage)

دیلاتاسیون به معنی بازکردن دهانه رحم برای پهن تر یا گشادتر کردن آن و کورتاژ به معنی تراشیدن یا برداشتن نمونه ای از آندومتر یا بافت درونی رحم برای معاینه های بعدی است. کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی-درمانی است.

در این عمل، جراح برای به دست آوردن نمونه از جدار داخلی رحم کورتاژ تشخیصی انجام می دهند.

